

Hed-Land Cinkmix

Összetétel

Cink (Zn): 700 g/l

Leírás

Talajtani szakirodalmak szerint Magyarország talajainak közel 50%-a közepes vagy gyenge cink ellátottságú. Ez minden termelőt megfontolásra kell készítsen, különösen azért, mert a cink hiánya következtében a termésveszteség jelentős mérvű is lehet! Cinkhiány esetén a kukorica növekedése visszafogottá válik. Hiánytünete a leveleken keletkező fehéres halványsárga csíkok. Kezdeti tünetek kezelésére javasoljuk a Hed-Land Cinkmix készítményt, amit láthatóan meghálál a kukorica.

Technológia

Növény	Dózis (l/ha)	Víz (l/ha)	Időzítés
kukorica	1	200-300	3-6 leveles állapotól címerhányásig
gabonafélék	1	200-300	őszi bokrosodáskor, tavasszal a 2. nádusznál
cukorrépa	1	200-300	4-6 leveles állapotól
repce	0,5-1	200-300	ősszel 6-8 leveles, tavasszal szárba induláskor
napraforgó	1	200-300	6-8 leveles, illetve csillagbimbós állapotáig
lucerna	0,5-1	200-300	8-10 cm-es hajtáshossznál
zöldségfélék	0,5-1	200-300	4-6 leveles állapotól
hagyma	1	200-300	3-4 leveles állapotól
bab, borsó	1	200-300	4-6 leveles állapotól
burgonya	0,5-1	200-300	1 héttel a teljes sorolás után
szőlő	1	500	hajtásnövekedés idején
gyümölcs	1	500	sziromhullás után